

# . Tin tức cần thiết về chích THUỐC NGỪA Covid-19

## Covid19 vaccine

Hiện nay, có 2 hãng làm Vaccine Covid 19, được FDA công nhận đó là Pfizer & Moderna.

### Sự khác biệt của Pfizer vaccine và Moderna Vaccine :

1) FDA approve Pfizer vaccine cho bệnh nhân từ 17 tuổi trở lên — trong khi Moderna từ 18 tuổi trở lên.

2) Pfizer vaccine dose là = 0.3 ml

Moderna là = 0.5 ml.

3) Pfizer cách 3 tuần = chích mũi 2,

Moderna cách 4 tuần = chích mũi 2.

Những điều cần biết trước khi chích Covid Vaccine (Pfizer & Moderna) :

**1) KHÔNG bị nhiễm COVID trong vòng 90 ngày** ▪ “TRƯỚC KHI” chích Vaccine.

**SAU 90 ngày** — đã bị nhiễm Covid = vẫn phải chích Covid vaccine.

**2) KHÔNG bị (= không có tiền sử) bất cứ phản ứng ANAPHYLACTIC REACTION** (= khó thở, rối loạn nhịp tim, huyết áp xuống, ngất xỉu) khi chích các loại thuốc vaccine khác.

**3) KHÔNG được uống TYLENOL / ADVIL — TRƯỚC KHI chích —** vì sẽ giảm hiệu ứng của Covid vaccine.

Có thể uống Tylenol — SAU KHI chích Vaccine — nếu bị sốt nhẹ (light fever).

**4) Những ai chích FILLER trên mặt khi làm thẩm mỹ nên cẩn thận —** vì Covid Vaccine sẽ phản ứng với filler và làm sưng mặt.

**5) Cả 2 loại VACCINE đều phải chích 2 LẦN.** ▪ Pfizer Vaccine ➡ cách 3 tuần sẽ chích mũi thứ 2.

▪ Moderna Vaccine ➡ cách 4 tuần sẽ chích mũi thứ 2.

Nếu không chích mũi thứ 2 — sẽ không có khả năng miễn nhiễm.

Vì theo nghiên cứu ➡ SAU mũi thứ 2 => cơ thể chúng ta sẽ có 95% khả năng miễn nhiễm với Covid-19 — SAU mũi thứ 1 => chỉ có 30-40% miễn nhiễm thôi.

**6) Cả 2 loại Vaccine đều có PHẢN ỨNG PHỤ giống nhau** như ➡ đau nhức ở chỗ chích + sốt nhẹ (light fever) + mệt mỏi + nhức đầu (headache).

▲ **PHẢN ỨNG PHỤ** xảy ra nhiều hơn => ở mũi chích thứ 2.

7) **Pfizer Vaccine** ➤ **phải được chứa trong FREEZER với nhiệt độ -80 F.**

— Trước khi sử dụng — phải chuyển qua REFRIGERATE (tủ lạnh) trong vòng 24 giờ.

▪ Moderna vaccine ➤ chỉ cần chứa trong FREEZER THƯỜNG (từ -13 F đến 5F).

**Cả 2 loại Vaccines đều có hiệu quả như nhau.**

**8) Thuốc Vaccine được cung cấp miễn phí** từ Federal xuống State — State phân phối xuống từng County.

County sẽ phân phối xuống từng bệnh viện trong County.

Nên chích Covid Vaccine đều hoàn toàn miễn phí — cho dù mình có bảo hiểm, Medical, Medicare hay không.

9) Sau khi chích xong — bệnh nhân sẽ được cho ngồi lại 15 phút — để các y tá theo dõi xem có phản ứng gì xảy ra / hay không.